



---

ARTIGO CIENTÍFICO

---

## Seleção de cultivares de cana-de-açúcar para a Zona da Mata Norte de Pernambuco II: Meio de safra

### *Selection of sugarcane cultivars to the North Forest Zone of Pernambuco II: crop Medium*

Aurélia Pietrina da Costa Albuquerque<sup>1</sup>, Gerson Quirino Bastos<sup>2</sup>, João de Andrade Dutra Filho<sup>3</sup>, Lauter Silva Souto<sup>4</sup>, Aline Carla de Medeiros<sup>5</sup>, Djalma Euzébio Simões Neto<sup>6</sup>

**Resumo:** Sendo os cultivares melhorados a base de sustentação e desenvolvimento do setor sucroenergético no Brasil, objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho agroindustrial de 26 cultivares de cana-de-açúcar na microrregião canavieira da Mata Norte de Pernambuco. O experimento foi conduzido na área agrícola da Usina Olho D'água, onde foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições. As variáveis analisadas foram: toneladas de pol por hectare, toneladas de cana por hectare, fibra, pol % corrigida, pureza, teor de sólidos solúveis e açúcar total recuperável. Realizou-se a análise de variância conjunta dos experimentos e estimativa de parâmetros genéticos, as médias foram agrupadas pelo teste de Scott e Knott ao nível de 5% de probabilidade. Realizou-se ainda a rentabilidade econômica bruta de cada cultivar. Constatou-se que a seleção de cultivares superiores deve ser baseada nas variáveis TPH e TCH. Como opções de cultivo comercial para a segunda época de colheita destacam-se como mais produtivas, RB93509, SP81-3250 e RB75126.

**Palavras-chave:** melhoramento vegetal, genética biométrica, *Saccharum* spp.

**Abstract:** Improved cultivars are support base and development of energetic and alcohol sector in Brazil, aimed with this work was to evaluate the agroindustrial performance of 26 sugarcane cultivars in the microrregion da Mata Norte of Pernambuco. The experiment was conducted in the agricultural area of the sugarmill Olho d'gua, which was used a randomized block with four replications. The variables analyzed were tons of pol per hectare, sugarcane tons per hectare, fiber, corrected pol%, purity, soluble solids content and total recoverable sugar. Were conducted the variance analysis and estimation of genetic parameters, the averages were grouped by the Scott and Knott test at 5% probability. It was held still gross economic profitability of each cultivar. The selection of superior cultivars should be based on TPH and TCH variables. As commercial cultivation options for the second harvest season stand out as more productive, RB93509, SP81-3250 e RB75126.

**Key-words:** plant breeding, biometric genetic, *Saccharum* spp.

---

\*Autor para correspondência

Recebido para publicação em 29/01/2016; aprovado em 12/03/2016

<sup>1</sup>Departamento de Agronomia (DEPA), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 52171-900, Recife, PE, Brasil.

<sup>2</sup>Departamento de Agronomia, UFRPE, Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 52171-900 Recife (PE). E-mail: [cjose@ufrpe.br](mailto:cjose@ufrpe.br);

<sup>3</sup>Prof. D. Sc. da UAGRA - UFCG - Pombal - PB, [filho-dutra@ig.com.br](mailto:filho-dutra@ig.com.br), [luijzose@hotmail.com](mailto:luijzose@hotmail.com)

<sup>4</sup>Professor, Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande; Pombal, PB, Brasil. E-mail: [lautersouto@yahoo.com.br](mailto:lautersouto@yahoo.com.br)

<sup>5</sup>Doutorada da PPGEP - UFCG - Campina Grande - PB E-mail: [alinecarla.edu@gmail.com](mailto:alinecarla.edu@gmail.com)

<sup>6</sup>Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina, Rua Ângela Cristina de Luna, Bairro Novo, CEP 55810-700 Carpina, PE, Brasil. E-mail: [desn@oi.com.br](mailto:desn@oi.com.br)



## INTRODUÇÃO

A cana-de-açúcar assume grande importância econômica, sendo considerada uma das culturas agrícolas mais importantes em regiões de clima tropical e subtropical, pelas grandes áreas plantadas, por gerar produtos como o açúcar, o álcool, bicompostível e o bagaço, que é um resíduo da cana utilizado para produção de eletricidade (ALMEIDA et al., 2009).

A qualidade dos materiais genéticos e os ganhos em produtividade são resultados dos conhecimentos científicos originados dos diversos programas de melhoramento genético ao longo dos anos, principalmente os trabalhos sobre estabilidade fenotípica e avaliação contínua da produtividade que permite um aumento dos ganhos genéticos, proporcionados pela distribuição otimizada dos cultivares nos vários ambientes (DUTRA FILHO et al., 2014).

Este crescimento na produtividade se deve a muitos fatores tais como: técnicas de manejo, desenvolvimento e implantação de uma moderna tecnologia agrícola, entretanto merece maior destaque os programas de melhoramento genético através do desenvolvimento contínuo de novas variedades mais produtivas com características agrônomicas favoráveis, resistentes as principais pragas e doenças (DUTRA FILHO et al., 2011a).

Os programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar têm como objetivo desenvolver, selecionar e recomendar cultivares mais produtivos, adaptáveis às condições de cada região de cultivo (SILVA, 2008). Para ser enquadrada como um cultivar ideal, o mesmo deve apresentar características como: elevada produtividade e baixo grau de flutuação em seu desempenho agroindustrial quando cultivado sob anos agrícolas sucessivos e diferentes épocas de colheita.

No Estado de Pernambuco, experimentos com a cultura da cana-de-açúcar são colhidos em início de safra, que corresponde aos meses de setembro e outubro; meio de safra, a novembro e dezembro; e final de safra, a janeiro e fevereiro; em três ciclos de colheita, cana planta, cana soca e cana rессoca, respectivamente. Desta forma, de posse dos dados, tem-se a possibilidade de avaliar a magnitude das interações (genótipos x ciclos de colheita), que geralmente são significativas (SOUZA et al., 2012).

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho agroindustrial de 26 cultivares de cana-de-açúcar na microrregião canavieira da Mata Norte de Pernambuco e selecionar os que se destacam para colheita em meio de safra.

## MATERIAL E MÉTODOS

De acordo com a caracterização edafoclimática das regiões canavieiras de Pernambuco, classificadas por Koffler et al. (1986), realizou-se a instalação e condução do experimento na área agrícola da Usina Central Olho D'água localizada na microrregião canavieira da Mata Norte de Pernambuco, no Município de Camutanga com as seguintes coordenadas geográficas (07°24'S e 35°16' W), altitude de 98 m durante as safras agrícolas 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados com quatro repetições. Foram avaliados 26 cultivares comerciais, conforme identificado (Tabela 1).

**Tabela 1.** Identificação dos genótipos de cana-de-açúcar, quanto à procedência.

Variedades	Procedência
1. RB867515	RIDESA
2. RB92579	RIDESA
3. SP81-3250	COPERSUCAR
4. Q138	AUSTRÁLIA
5. RB863129	RIDESA
6. SP79-1011	COPERSUCAR
7. RB93509	RIDESA
8. RB75126	RIDESA
9. RB942520	RIDESA
10. SP78-4764	COPERSUCAR
11. RB892700	RIDESA
12. RB953180	RIDESA
13. RB942898	RIDESA
14. RB953281	RIDESA
15. RB952900	RIDESA
16. RB942991	RIDESA
17. RB72454	RIDESA
18. RB872552	RIDESA
19. RB943365	RIDESA
20. RB952675	RIDESA
21. RB928064	RIDESA
22. RB942849	RIDESA
23. RB813804	RIDESA
24. RB943161	RIDESA
25. RB943066	RIDESA
26. RB943538	RIDESA

As parcelas experimentais foram constituídas por 5 linhas de 8 m, com espaçamento de 1 m entre linhas e 1 m entre plantas, totalizando uma área útil de 40 m<sup>2</sup>.

As correções de pH do solo e adubações do campo experimental foram realizadas conforme o sistema de produção canavieira da empresa agroindustrial. Os materiais utilizados neste trabalho, clones e variedades foram oriundos de sementeira do PMGCA/UFRPE/RIDESA, conduzida na mesma região.

As variáveis analisadas foram: toneladas de pol por hectare (TPH), toneladas de cana por hectare (TCH), fibra (FIB), pol % corrigida (PCC), pureza (PZA), teor de sólidos solúveis (BRIX) e açúcar total recuperável (ATR).

Para estimar a produtividade por área (TCH), foi realizada a pesagem de todos os colmos da parcela, obtendo-se o valor em kg, e, posteriormente, os mesmos foram transformados em TCH através da seguinte equação (Peso total da parcela x 10 / área útil da parcela em m<sup>2</sup>). Para obter a Tonelada de pol por hectare (TPH), foi realizado o cálculo baseado na produtividade agrícola e na pol % corrigida (TCH x PCC / 100), obtendo-se assim a produtividade industrial.

As variáveis pureza (PZA), teor de sólidos solúveis (BRIX), açúcar total recuperável (ATR), pol % corrigida (PCC) e fibra (FIB) foram estimadas de acordo com a metodologia proposta por Fernandes (FERNANDES, 2003).

Com o intuito de apresentar o comportamento dos genótipos em termos econômicos, foi realizada a análise da rentabilidade econômica bruta utilizando a seguinte expressão: valor em kg de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) x Tonelada de cana por hectares (TCH) x Preço do kg de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR).

A análise de variância conjunta de experimentos foi realizada segundo o modelo estatístico apresentado por Cruz

$$(2006): Y_{ijk} = \mu + (b/c)_{jk} + g_i + c_k + gc_{ik} + \varepsilon_{ijk}$$

Onde:

$Y_{ijk}$ : observação do i-ésimo genótipo, avaliado no j-ésimo bloco dentro do k-ésimo corte

$\mu$ : média geral do ensaio;

$(b/c)_{jk}$ : efeito do bloco j dentro do corte k;

$g_i$ : efeito do tratamento (ou genótipo) i;

$c_k$ : efeito do corte k;

$gc_{ik}$ : efeito da interação entre o genótipo i e o corte k e;

$\varepsilon_{ijk}$ : erro aleatório associado a observação ijk.

Foram determinados como fixos, os efeitos de médias ( $\mu$ ) e genótipos (g), e aleatórios os efeitos do bloco (b), corte (c), interação genótipo corte (gc) e o erro experimental ( $\varepsilon$ ). Os resultados da análise de variância conjunta dos três cortes dos três experimentos foram obtidos através do esquema apresentado na tabela 2.

Para verificar a homogeneidade das variâncias residuais, antes da execução da análise de grupos de experimentos, foi realizado o teste F máximo de Hartley, onde, de acordo com as recomendações de Gomes (1990), todas as variáveis apresentaram um valor inferior a 7 (sete) para a razão entre a maior e a menor variância do erro.

Ainda segundo Cruz (2006), foram estimados os seguintes parâmetros:

$$\hat{\sigma}_g^2 = \frac{QMG - QMGA}{cr}$$

Componente de variância genética:

Componente de variância da interação genótipo x corte:

$$\sigma_{gc}^2 = \frac{QMGC - QMR}{r} \frac{g - 1}{g}$$

$$\text{Herdabilidade média: } h^2 = \frac{\hat{\sigma}_g^2}{(QMG / cr)}$$

Coefficiente de variação genético:

$$CV_g = \frac{(100 \sqrt{\hat{\sigma}_g^2})}{m}$$

$$\text{Índice b: } CV_g / CV_e = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_g^2}{\sigma^2}}$$

As médias foram agrupadas pelo teste de Scott e Knott a 5% de probabilidade, as análises genético-estatísticas foram processadas com o auxílio do programa Genes (CRUZ, 2006).

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram detectadas, através do teste F, diferenças significativas a 1% de probabilidade ( $P < 0,01$ ) para as variáveis toneladas de pol por hectare (TPH), toneladas de cana por hectare (TCH), fibra (FIB), pol % corrigida (PCC), teor de sólidos solúveis (BRIS) e açúcar total recuperável (ATR) indicando a ocorrência de variabilidade genética entre os cultivares (Tabela 2).

Para os ciclos de colheita considerados (cana planta, soca e resoca), observam-se diferenças significativas a 1% de probabilidade em relação às variáveis toneladas de pol por hectare (TPH), toneladas de cana por hectare (TCH), fibra (FIB), pureza (PZA), teor de sólidos solúveis (BRIS) e açúcar total recuperável (ATR) e a 5% de probabilidade ( $P < 0,05$ ) para pol % corrigida (PCC). De acordo com Rosse et al. (2002), os fatores edafoclimáticos nos diferentes ciclos de colheita se comportam como ambientes contrastantes (Tabela 2).

Em relação à interação genótipo x corte (ciclos de colheita), assim como foi observado na primeira época de colheita, houve significância quando estudadas as variáveis toneladas de pol por hectare (TPH), toneladas de cana por hectare (TCH), fibra (FIB), pol % corrigida (PCC) e açúcares totais recuperáveis (ATR), indicando que a expressão fenotípica dos cultivares avaliados é influenciada pelos diferentes ciclos de colheita, para o meio da safra na região canavieira, onde foi conduzido o experimento. Quando estudado o caráter teor de sólidos solúveis (BRIS), não houve diferença significativa, indicando estabilidade nos ciclos de colheita para o meio de safra. Melo et al., (2009) encontraram resultados semelhantes para essas variáveis ao avaliarem o desempenho agroindustrial de cultivares de cana-de-açúcar no Litoral Sul de Pernambuco. Segundo esses autores a análise da interação genótipo x ciclo de colheita sinaliza ao melhorista a longevidade dos cultivares (Tabela2).

**Tabela 2.** Resumo da análise de variância conjunta avaliada em grupos de experimentos conduzidos na fase de competição de variedades na segunda época de colheita (meio de safra) na Microrregião canavieira da Mata Norte de Pernambuco, Usina Central Olho D'água, Camutanga - PE, anos agrícolas 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

F.V	G.L	Quadrados médios						
		TPH	TCH	FIB	PCC	PZA	BRIS	ATR
<b>G</b>	25	20,13*	722,43*	2,08*	6,15*	56,33 <sup>ns</sup>	12,53*	471,5*
<b>Corte</b>	2	1228,76**	50954,2**	31,22**	13,4*	427,36**	61,54**	3381,48**
<b>G x C</b>	50	10,47**	337,99**	1,43**	2,86**	73,54 <sup>ns</sup>	5,15 <sup>ns</sup>	219,06**
<b>Resíduo</b>	225	3,38	89,37	0,55	1,6	81,05	4,16	112,75
<b>Médias</b>		11,77	80	14,12	14,66	86,57	20,83	144,69
<b>C.V (%)</b>		15,63	11,82	5,27	8,63	10,4	9,79	7,34
<b>&gt; QMR / &lt;QMR</b>		3,27	1,51	1,83	2,7	30,96	6,89	2,67

\*\*e \* Significativo a 1 e 5 % de probabilidade pelo teste F ; ns, não significativo, pelo teste F; G x C Interação Genótipo x Corte

Em relação aos parâmetros genéticos estimados (tabela 3), observa-se índice b inferior a uma unidade, variância da interação genótipo x corte superior ao componente de variância genética para os caracteres toneladas de pol por hectare (TPH), toneladas de cana por hectare (TCH), pol % corrigida (PCC), pureza (PZA) e açúcar total recuperável (ATR). Conclui-se então que os cultivares não apresentam, para esta época de colheita, elevado potencial para fins de

melhoramento. Porém, percebe-se que ainda é possível selecionar materiais superiores para tonelada de cana por hectare (TCH) e toneladas de pol por hectare, entre os cultivares que foram avaliados no presente trabalho para serem cultivados e colhidos no meio da safra nesta microrregião canavieira, tendo em vista que o valor da determinação genotípica em nível de média apresentou média magnitude e o teste de médias formou grupos superiores.

**Tabela 3.** Parâmetros estimados em três cortes das características avaliadas na fase de competição de variedades na segunda época de colheita (meio de safra) em experimento conduzidos na Microrregião canavieira da Mata Norte de Pernambuco, Usina Central Olho D'água, Camutanga - PE, anos agrícolas 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

Caracteres	Parâmetros				
	$\phi_g^2$	$\phi_{gc}^2$	$h^2$	CV <sub>g</sub>	CV <sub>g</sub> /CV <sub>c</sub>
TPH	0,81	1,70	48,00	7,63	0,49
TCH	32,04	59,76	53,22	7,07	0,60
FIB	0,53	0,21	30,93	1,64	0,31
PCC	0,27	0,30	53,40	3,67	0,41
PZA	0	0	0	-	-
BRIX	0,61	0,24	58,89	3,76	0,38
ATR	21,03	25,56	53,54	3,17	0,43

$\phi_g^2$ : Componente de variância genética;  $\phi_{gc}^2$ : Componente de variância da interação genótipo corte;  $h^2$ : Herdabilidade média, CV<sub>g</sub>: Coeficiente de variação genético; CV<sub>g</sub>/CV<sub>c</sub>: Índice b

Pelo teste de Skott e Knott aplicado (Tabela 4), a 5% de probabilidade ( $P < 0,05$ ), constata-se que para o caráter tonelada de pol por hectare (TPH) observou-se a formação de grupos superiores onde no grupo "a" enquadram-se os genótipos RB93509, SP81-3250, RB863129, RB75126 e

RB867515, SP78-4764, RB92579, SP79-1011, RB892700, RB943365, RB942991 e Q138.

Para o caráter tonelada de cana por hectare (TCH), houve formação de grupos superiores, onde no grupo "a" enquadram-se as variedades RB93509, RB75126, RB863129, SP81-3250, SP78-4764, RB92579, Q138 e RB953281.

**Tabela 4.** Valores médios dos caracteres TPH, TCH, FIB, PCC, PZA, BRIX e ATR para a 2ª época de colheita, meio de safra, avaliados na fase de competição de variedades considerando os cultivos de cana planta, soca e ressoça (3 cortes) em grupos de experimentos conduzidos na região na Microrregião canavieira da Mata Norte de Pernambuco, Usina Central Olho D'água, Camutanga - PE, anos agrícolas 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

Variedades	Variáveis													
	TPH (t/ha)	TCH (t/ha)	FIB (%)	PCC (%)	PZA (%)	BRIX (%)	ATR (kg/t)							
RB93509	15,14	a	99,00	a	14,42	a	15,19	a	86,59	a	21,6	a	149,63	a
SP81-3250	13,75	a	89,00	a	13,88	a	15,37	a	88,27	a	21,25	a	151,26	a
RB863129	13,16	a	90,25	a	13,75	a	14,58	a	84,40	a	20,99	a	144,06	a
RB75126	13,12	a	90,75	a	13,47	a	14,56	a	86,66	a	20,31	a	144,16	a
RB867515	13,05	a	85,83	b	14,45	a	15,13	a	87,44	a	21,33	a	148,95	a
SP78-4764	12,60	a	87,33	a	14,58	a	14,35	a	86,39	a	20,48	a	142,35	a
RB92579	12,40	a	87,25	a	14,14	a	14,35	a	86,06	a	20,42	a	141,13	a
SP79-1011	12,38	a	80,25	b	14,39	a	15,21	a	88,88	a	21,05	a	150,94	a
RB892700	12,21	a	80,42	b	14,46	a	15,09	a	86,81	a	21,36	a	148,48	a
RB943365	12,13	a	79,17	b	13,78	a	15,11	a	88,30	a	20,86	a	149,12	a
RB942991	12,08	a	81,75	b	13,40	a	14,87	a	84,87	a	21,33	a	145,23	a
Q138	11,89	a	82,67	a	13,80	a	14,45	a	85,85	a	20,49	a	142,95	a
RB872552	11,69	b	76,42	b	13,82	a	15,40	a	92,02	a	20,53	a	148,19	a
RB72454	11,64	b	79,17	b	13,24	a	14,70	a	81,89	a	23,21	a	143,01	a
RB953281	11,41	b	85,17	a	14,69	a	13,68	a	81,53	a	20,83	a	138,52	a
RB943161	11,28	b	75,33	b	14,34	a	14,93	a	87,50	a	21,00	a	146,52	a
RB942898	11,26	b	76,58	b	14,58	a	14,61	a	88,18	a	20,48	a	143,17	a
RB952675	11,01	b	77,58	b	14,45	a	14,13	a	87,77	a	19,85	a	140,56	a
RB942520	10,89	b	65,5	b	14,31	a	16,58	a	86,34	a	23,73	a	161,64	a
RB953180	10,86	b	78,17	b	13,68	a	13,89	a	86,27	a	19,57	a	137,57	a
RB928064	10,83	b	72,92	b	14,30	a	14,72	a	87,81	a	20,61	a	145,76	a
RB813804	10,72	b	72,08	b	14,37	a	14,72	a	86,28	a	20,99	a	146,26	a
RB943538	10,71	b	73,00	b	14,42	a	14,58	a	87,91	a	20,42	a	143,98	a
RB952800	10,63	b	75,00	b	14,04	a	14,09	a	86,63	a	19,92	a	138,71	a
RB943066	10,55	b	72,50	b	14,68	a	14,49	a	87,10	a	20,59	a	143,93	a
RB942849	8,51	b	67,5	b	13,82	a	12,59	a	83,24	a	18,42	a	126,06	a

Médias seguidas da mesma letra pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott & Knott, ao nível de 5% de probabilidade.

Para a variável TCH, observa-se a formação de grupos superiores onde no grupo “a” enquadram-se os cultivares RB92579, RB867515, RB75126, RB93509, SP81-3250, RB942991, RB72454, RB863129. Com destaque para RB92579, considerado o mais produtivo em toneladas de cana por hectare.

Em relação às variáveis, FIB, PCC, PZA, BRIX e ATR, ao nível de 5% de probabilidade não se observou formação de grupos distintos.

A rentabilidade econômica bruta está explicitada na tabela 5.

**Tabela 5.** Valores econômicos, em reais por hectare, dos 11 clones e 15 variedades comerciais avaliadas na fase de competição de variedades na segunda época de colheita (meio de safra) considerando os cultivos de cana planta, soca e ressoca (3 cortes) em grupos de experimentos conduzidos na região canavieira da Mata Norte de Pernambuco usina Olho Central D’água, Camutanga-PE, anos agrícolas 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

Variedades	Valor econômico baseado em ATR t/ha
RB93509	R\$ 7.406,69
SP81-3250	R\$ 6.731,07
RB75126	R\$ 6.541,26
RB863129	R\$ 6.500,71
RB867515	R\$ 6.392,19
SP78-4764	R\$ 6.215,71
RB92579	R\$ 6.156,80
SP79-1011	R\$ 6.056,47
RB892700	R\$ 5.970,38
RB942991	R\$ 5.936,28
Q138	R\$ 5.908,84
RB943365	R\$ 5.902,92
RB953281	R\$ 5.898,87
RB872552	R\$ 5.662,34
RB72454	R\$ 5.661,05
RB943161	R\$ 5.518,68
RB942898	R\$ 5.481,98
RB952675	R\$ 5.452,32
RB953180	R\$ 5.376,92
RB928064	R\$ 5.314,41
RB942520	R\$ 5.293,71
RB813804	R\$ 5.271,21
RB943538	R\$ 5.255,27
RB943066	R\$ 5.217,46
RB952800	R\$ 5.201,63
RB942849	R\$ 4.254,53

Constata-se como às três melhores opções de cultivo para colheita no meio da safra, com as variedades RB93509, SP81-3250 e RB75126 apresentando receita econômica da ordem de R\$ 7.406,69, R\$ 6.731,07 e R\$ 6.541,26 por quantidade de ATR por hectare, respectivamente.

## CONCLUSÕES

A seleção de cultivares pode ser realizada com base nas variáveis TCH e TPH.

Os cultivares RB93509, SP81-3250 e RB75126 são os mais produtivos e opções de cultivo para colheita no meio da safra.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, C.M.A.; LIMA, S.E.N.; LIMA, G.S.A.; BRITO, J.Z.; DONATO, V.M.T.S.; SILVA, M.V. Caracterização molecular de cultivares de cana-de-açúcar utilizando marcadores ISSR. *Ciência e Agrotecnologia*, v. 33, p. 1771-1776, 2009.

CRUZ, C.D. 2006. Programa GENES: aplicativo computacional em genética e estatística. Editora UFV, Viçosa, Brasil. 2006. 442p.

DUTRA FILHO, J.A.; BASTOS, G.Q.; MACHADO, P.R.; SILVA, L.J.; SIMÕES NETO, D.E.; CHAVES, A.; SILVA, F.S.G. Estimativa do ganho de seleção para a produtividade em famílias de cana-de-açúcar. *Comunicata Scientiae*, v. 3, n. 1, p. 35-40.

DUTRA FILHO, J.A., MELO, L.J.O.T., RESENDE, L.V., ANUNCIÇÃO FILHO, C.J., BASTOS, G.Q. Aplicação de técnicas multivariadas no estudo da divergência genética em cana-de-açúcar. *Revista Ciência Agronômica*, v. 42, n. 1, p. 185-192, 2011b.

FERNANDES, A.C. Cálculos na agroindústria da cana-de-açúcar. 2.ed. Piracicaba: EME, 2003. 240p.

GOMES, F. P. Curso de estatística experimental. 13. ed. Piracicaba: USP, 1990. 467 p.

KOFFLER, N.F., LIMA, J.F.W.F., LACERDA, M.F., SANTANA, J.F., SILVA, M.A. Caracterização edafoclimática das regiões canavieiras do Brasil: PERNAMBUCO. Editora IAA, Piracicaba, Brasil. 1986. 78p.

DUTRA FILHO, J.A.; CALSA JUNIOR, T.; SIMÕES NETO, D.E. 2014. Phenotype adaptability and stability of sugarcane genotypes in the sugarcane belt of the State of Pernambuco, Brazil. *Genetics and Molecular Research*, v. 13, n. 3, p. 6865-6877, 2014.

MELO, L.J.O.T.; OLIVEIRA, F.J.; BASTOS, G.Q.; ANUNCIÇÃO FILHO, C.J.; REIS, O.V. 2009. Desempenho agroindustrial de variedades de cana-de-açúcar na zona da mata litoral sul de Pernambuco. *Ciência e Agrotecnologia*, v. 33, n. 3, p. 684-691, 2009.

ROSSE, L.N.; VENCOSKY, R.; FERREIRA, D.F. Comparação de métodos de regressão para avaliar a estabilidade fenotípica em cana-de-açúcar. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v. 37, n. 1, p. 25-32, 2002.

SILVA, M. A. Interação genótipo x ambiente e estabilidade fenotípica de cana-de-açúcar em ciclo de cana de ano. *Bragantia*, v. 67, n. 1, p. 109-117, 2008.

SOUZA, P.H.N.; BASTOS, G.Q.; ANUNCIÇÃO FILHO, C.J.; DUTRA FILHO, J.A.; MACHADO, P.R. 2012. Avaliação de genótipos de cana-de-açúcar para início de safra na Microrregião Centro de Pernambuco. *Revista Ceres*, v. 59, n. 5 : p. 427-432, 2012.